

Informatie fruitsoorten Buren 2022

Met dank aan www.batterijen.nl

Appelbomen

Bloemeezoet (stoofappel)

De Malus Domestica 'Bloemeezoet' is een gele appel met een rode blos en een zoete smaak. Deze appel is minder geschikt voor directe consumptie maar wel geschikt als stoofappel en om te drogen. Deze appelboom is weinig gevoelig voor ziektes.

Bloeitijd en rijptijd

De 'Bloemeezoet' appelboom bloeit in de maanden april en mei met witte bloemen. De appels kunnen in september geoogst worden.

Standplaats

Deze boom verlangt een zonnige standplaats met een goed doorlatende vochtige bodem. Te natte bodem wordt slecht verdragen.

Cox Orange Pippin (handappel)

Malus domestica 'Cox's Orange Pippin', ook wel bekend als de Cox appelboom, is een populaire zoete en smaakvolle appel. Het is een gezond groeiend ras, makkelijk te kweken en lang te plukken. De Cox appel is geschikt als handappel, maar vooral als moesappel en dessertappel.

Bloeitijd en rijptijd

De 'Cox' appelboom bloeit rond april/mei met prachtige zachtroze bloemen. Rond september zijn de vruchten rijp.

Standplaats

Deze appelboom staat bij voorkeur op een plaats in de volle zon of halfschaduw. Een zonnige plek bevordert de appeloogst en is belangrijk voor de vorming van de bloesem.

Perenbomen

Doyenne du Comice (handpeer)

De Doyenné du Comice is een grote handpeer met een korte onregelmatige vorm. Hij heeft van nature een groene kleur met roodbruine tinten, roestkleurige vlekken en stippen. Het vruchtvlees is helderwit van kleur, uiterst sappig en heerlijk zacht. De Doyenne du Comice is zeer geschikt als handpeer.

Bloeitijd en rijptijd

De Doyenne du Comice bloeit in april met decoratieve witte bloesemen. De vruchten zijn rijp in september/oktober.

Standplaats

De boom staat bij voorkeur in de zon of in de halfschaduw, dat bevordert de perenoogst. Hoe zonniger, hoe sappiger de peren. Elke normale tuingrond is geschikt.

(Saint Remy) stoofpeer

Pyrus communis 'Saint Remy' is een zeer sterke groeier met goede opbrengst. De schil van deze peer heeft een groene kleur met roestkleurige vlekken en stippen, waarbij de zonkant een

bruinrode bloes heeft. Vanwege het harde en stevige vruchtvlees en de weinig uitgesproken smaak kan de Saint Rémy alleen worden gebruikt als stoofpeer. De peer heeft een minder uitgesproken smaak als bijvoorbeeld de Gieser Wildeman, waardoor bij het koken suiker toegevoegd moet worden.

Na het koken als stoofpeer kan de Saint Rémy worden gebruikt als moes, compote of perenvullingen in taarten en gebak. De peren zijn lang bewaarbaar.

Bloeitijd en rijptijd

De Saint Remy bloeit in april met decoratieve witte bloesem. De vruchten zijn rijp in september/oktober.

Standplaats

De boom staat bij voorkeur in de zon of in de halfschaduw, dat bevordert de perenoogst. Hoe zonniger, hoe sappiger de peren. Elke normale tuingrond is geschikt.

Pruimenbomen

Anna Späth

De *Prunus domestica* 'Anna Späth', oftewel Anna Spath, is een grote langwerpige pruim die paarsrood van kleur is. De 'Anna heeft een goede een goede smaak, deze pruim is sappig en aangenaam zoet.

Bloeitijd en rijptijd

Deze pruimenboom bloeit in de maanden april en mei met witte bloemen. De pruimen zijn rond oktober rijp.

Standplaats

De boom staat bij voorkeur op een plaats in de volle zon of halfschaduw. Een zonnige plek bevordert de pruimenoogst en smaak van de vrucht. De voorkeur is een humusrijke- en goed doorlatende grond.

Opal

De *Prunus domestica* 'Opal' is een kleine donkerblauwe tot paars-rode pruim met een zoete smaak. De 'Opal' is een zeer bekend en makkelijk ras en erg geschikt voor de particuliere tuinen.

Bloeitijd en rijptijd

Deze pruimenboom bloeit in de maanden april/mei met witte bloemen. De pruimen zijn rond juli rijp.

Standplaats

De boom staat bij voorkeur op een plaats in de volle zon of halfschaduw. Een zonnige plek bevordert de pruimenoogst en smaak van de vrucht. De voorkeur is een humusrijke- en goed doorlatende grond.